

ACTIAS Lepidoptera Zuchtbericht

<i>Thema</i>	Morpho Peleides
<i>Gattung Art</i>	
<i>Verfasser</i>	Pflanzenfreund
<i>Herkunft</i>	Die Eier bekam ich aus Frankreich
<i>Kopula</i>	
<i>Eiablage</i>	
<i>Raupenschlüpf</i>	24. Mai 2011: Die ersten Raupen schlüpfen, sie fressen die Eischale sonst fressen sie ca. einen Tag nichts. Die Raupen befinden sich in einem kleinen Plastikgefäß mit Blättern von weißem Klee. Bevor sie sich häuten, spinnen sie sich ein Sitzpolster, da bleiben sie einige Tage darauf sitzen. Am besten erkennt man, dass sie knapp vor der Häutung stehen, wenn sich die Kopfkapsel absetzt.
<i>Häutung zu L2</i>	Nach ca. 8 Tagen häuten sich die ersten zu L2. Sie sind nun gelb-rot. Damit sich der Klee länger hält, geb ich die Stiele in ein kleines Gefäß mit Wasser. 

Häutung zu L3

Nach weiteren 8 Tagen folgt die Häutung zu L3. Das Rot der Raupen wird eher dunkler, gelb ist weiterhin vorhanden.



Häutung zu L4

Wiederum nach ca. 8 Tagen ist die nächste Häutung.



<i>Häutung zu L5</i>	Nach ca. 8 Tagen ist Häutung zu L5. In diesem Stadium bleiben sie ca. 2 Wochen. Die Farbe wechselt nun zu braun-orange. Sie fressen nun jede Menge. Ich füttere roten Klee, da dieser mehr Blattmasse hat. Außerdem sind lange Stängel mit Blüten dabei und auf diesen Stängeln sitzen sie gerne. Interessanterweise fressen sie in diesem Stadium nur mehr nachts. Den ganzen Tag sitzen sie reglos auf ihrem Platz, gegen 11 nachts geht's los mit der Nahrungsaufnahme. Sie werden ca. 7,3 cm lang, dann stellen sie das Fressen ein und verfärben sich grün. Sie schrumpfen zusammen. Dann hängen sie sich auf Stängeln auf. Dieses Präpuppenstadium dauert ca. 3 Tage, dann verpuppt sich die Raupe. 
<i>Häutung zu L6</i>	
<i>Diapause</i>	
<i>Ende Diapause</i>	

Verpuppung

Die erste Verpuppung findet am 21. 7. statt- also etwa 2 Monate nach dem Schlupf. Die Puppe ist eine Stürzpuppe und ist grün. Da s Puppenstadium dauert ca. 17-22 Tage.

Frisch verpuppt, in der nächsten Stunde verändert sich die Form



So ist die endgültige Form

*Schlüpfen
der Falter*

Der erste Falter schlüpft am 12. 8. – etwa 3 Wochen nach Verpuppung. Die Puppe verfärbt sich, sie wird dunkel, dann treten hellere Flecken auf, bald darauf schlüpft der Schmetterling . Eine Puppe fiel leider zu Boden, ich ließ sie liegen. Leider wurde daraus ein

	verkrüppelter Falter, da er nicht hochkrabbelte, obwohl er die Möglichkeit hatte. Ich werde bei ähnlichen Fällen in Zukunft die Puppen mit einem kleinen Tropfen Klebstoff auf einen Stängel ankleben. Wenn der Schmetterling schlüpft, hält er sich nur an der Puppenhaut an und klettert selbständig nirgends hinauf.
<i>Original-Futterpflanzen</i>	Mucuna pruriens, Lonchocarpus
<i>Bei der Zucht verwendetes Futter</i>	Weißer und roter Klee
<i>Haltung der Raupen</i>	Im Zimmer am Anfang bis L4 in Plastikdosen, danach in einem Ikea-Gazekäfig.
<i>Überwinterung als</i>	
<i>Überwinterungshinweise</i>	Keine Überwinterung, da Tropenschmetterlinge
<i>Weitere Tipps</i>	Die Schmetterlinge konnten in meinem Wintergarten frei herumfliegen. Zum Glück war zu dieser Zeit wunderbares Sommerwetter und die Schmetterlinge waren viel unterwegs. Die Männchen fliegen sich gegenseitig sehr geschickt nach. Die Weibchen sitzen ruhig herum. Es kam zu 6 Paarungen, meist am späteren Vormittag im Schatten. Kopula dauert ca. 1 Stunde.  Das Männchen entfernt sich, das Weibchen bleibt sitzen. Nach einigen Tagen geht es los mit der Eiablage. Bei mir wurden Eier hauptsächlich auf Wisteria gelegt, ein Weibchen legte nur auf Cassia ab, einige Eier waren auch auf Passionsblume zu finden. Pro Tag legte ein Weibchen zwischen 10-20 Eier. Die Männchen leben ca 2- 3 Wochen, die Weibchen etwas länger. 4 Wochen wurden bei mir die ältesten. Die Schmetterlinge saugen an überreifem Obst. Bei mir bekamen sie zerquetschte Banane mit ein bisschen Wasser.



2 Männchen.

Die Weibchen schillern auch blau, allerdings ist die braune Umrandung breiter